

## TABLEAU DE RISQUES D'INFECTION TRANSMISSIBLE SEXUELLEMENT ET PAR LE SANG (ITSS)

Ce tableau indique le risque de contracter une ITSS quand on n'utilise aucun moyen de protection. L'utilisation du condom pour les rapports sexuels anaux, vaginaux et oraux réduit de façon significative, sans toutefois éliminer, le risque de contracter une ITSS. L'efficacité du condom est compromise si le condom brise, fuit ou glisse durant les activités sexuelles. Nous recommandons fortement l'usage du condom en latex lorsque vous vous adonnez aux rapports sexuels anaux, vaginaux et oraux. D'autres préservatifs tels que le condom féminin et la digue dentaire sont aussi efficaces et à recommander.

	● Risque élevé	◐ Risque moyen	○ Aucun risque	○ Aucun risque	○ Aucun risque	○ Aucun risque	○ Aucun risque
Infection transmissible sexuellement	Rapports sexuels anaux	Rapports sexuels vaginaux	Rapports sexuels oraux (tu donnes)	Rapports sexuels oraux (tu reçois)	Baiser profond	Masturbation mutuelle	Caresse, Baiser, Massage Masturbation
Le VIH / le sida	●	●	◐	○	○	○	○
La chlamydia	◐	●	◐	○	○	○	○
Les verrues génitales (aussi dans l'anus, la bouche et la gorge)	●	●	●	◐	◐	○	○
L'hépatite B	●	●	●	●	◐	○	○
La gonorrhée	●	●	●	●	◐	○	○
La syphilis	●	●	●	●	◐	○	○
L'hépatite B	●	●	●	●	◐	○	○
La vaginite (fait surtout référence aux femmes)	ne s'applique pas	●	ne s'applique pas	○	ne s'applique pas	○	○
La cervicite purulente (fait surtout référence aux femmes)	ne s'applique pas	●	ne s'applique pas	○	ne s'applique pas	○	○
L'urétrite non gonococcique (fait surtout référence aux hommes)	●	●	ne s'applique pas	○	ne s'applique pas	○	○
Infections intestinales	●	◐	◐	○	○	○	○
Infestations de poux et gale	●	●	◐	◐	○	◐	◐ (sauf massage)
En général	●	●	●	◐	◐	○	○